

Thérapeutique infantile.

Traitement des cystites chez les enfants.

La cystite est une affection qui n'est pas rare chez les enfants ; elle se rencontre beaucoup plus fréquemment chez les filles que chez les garçons. Son étiologie est souvent obscure. Dans la cystite infantile, les urines ne sont pas toujours alcalines ; elles peuvent être aussi de réaction acide.

La *Semaine médicale* dit que cette variété de cystite avec urine acide serait due, d'après M. le docteur Escherich, professeur de pédiatrie à la Faculté de médecine de Gratz, à l'infection par le colibacille. Dans le traitement des cystites avec urines alcalines, M. Escherich a recours aux lavages de la vessie, pratiqués deux fois par jour, avec une solution tiède d'acide borique à 1 ou 2 % ou de thymol à 5 %. En outre, il administre à l'intérieur une ou deux potions ci-dessous formulées :

Chlorate de potasse.....	2 à 3 grammes
Eau.....	150 —
Sirop simple.....	10 —

F. S. A. — A prendre : une cuillerée à dessert toutes les deux heures.

Traitement de l'onanisme chez les enfants.

Onanisme inconscient du jeune âge. — Prophylaxie : soins quotidiens et minutieux de propreté. Chaque soir et chaque matin, lotion des organes génitaux avec de l'eau de guimauve. Essuyer et poudrer légèrement d'amidon ou de riz.

Faire coucher l'enfant du deuxième âge avec une chemise longue, coulissée au-dessous des pieds.

Dans le cas de prurit intense, lotions fréquentes avec :

BOUCHUT

Sublimé corrosif.....	0 gr. 10
Eau.....	300

M.

S'il y a coexistence de phimosis, pratiquer la circoncision.

Onanisme rebelle, fillette ou garçon. — Fixer à l'aide d'un bandage une pelote entre les genoux. Pendant la nuit, attacher les mains de l'enfant.

Chez les enfants grandets : lit dur. Exiger que l'enfant saute du lit aussitôt réveillé. Exercice forcé dans la journée. Surveillance constante. Coercition morale.

Alimentation peu stimulante. Ni vin, ni alcool, ni thé, ni café.

Chaque soir, faire prendre un bain de siège froid et administrer une cuillerée à café ou à dessert de la potion suivante :

Bromure de sodium.....	} ââ 5 gr.
Eau distillée de laurier-cerise.....	}
Eau distillée.....	} ââ 30 gr.
Sirop de fleur d'oranger.....	}

F. S. A.

(Journ. de clinique et thérap. infantiles.)